lue deux fois

B

Observation sur une Exomphale

Une Dame âgé d'environ soixante ans avoit une Exomphale depuis vingt cinq, sans avoir voulut s'assujetir a porter de Bandage malgré les Conseils de plusieurs Chirurgiens qui luy en avoit fait sentir la necessité.

Cette tumeur s'estoit parvenut par degré au volume de la forme d'un Chapeau, ~~les fibres~~ de la peau n'ayant put resister a l'Efort des partyes Contenut dans la tumeur, il se fit un ulcere de la longeur d'environ un Ecu de six livres que la malade pancait Elle meme depuis plusieurs années, Cette infirmités ~~qui~~ ne l'empechoit point de vaquer a ses affaires se promenant seul a la Campagne Elle fit une Chute sur le ventre qui donna lieu a la partye ulcerer de se dechirer Et de former une playe de la longueur d'environ dix pouces, qui Comprenait les deux tiers de la tumeur Circulairement, non seulement les intestins qui formait la hernye sortirent par la playe, mais ils furent Encore suivits d'une quantité de Ceux Contenut dans le Bas ventre, Cette dame se trouvant sans secour Eut le courage de soutenir Cette quantiter d'intestins avec sa Chemise Et de faire plus de trente pas seul pour retourner chez son gendre

Le sieur grasse Chirurgien des Dames Religieuses de l'abaye Royal de Montmartre, ayant Estés appellés, trouvant la malade en danger il me fit mander, en m'attendant il la fit transporter ~~la malade~~ dans un lit, il dettacha la Chemise que le sang avoit collé aux intestins, ayant le soin de l'humecter avec du vin Chaud, Et fit Ensuite les tentatives pour faire la reduction

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

ARC 16 d 4 n° 106

des intestins, n'ayant point y parvenir
Entierement, il appliqua des Compresses dans
le vuide qu'il assujettit avec un Bandage
de Corps mediocrement serré,
m'ayant fait le recitte de l'accident, et de la
quantité d'intestins restée au dehors, la
necessité de les faire rentrer me fit de faire
le pareil, pour quoi je delassé la serviette
et levai les Compresses avec toutes les
precautions convenables pour eviter la sortye
des intestins rentrés dans la Cavités du ventre
je fut surpris de la quantité de ceux que
je trouvé au dehors, une partye de la surface
du ventre en estoit recouverte, et je suis
persuadé que leur volume formait dix a
douze pieds de longueur
je fit coucher la malade la teste tres basse
et les genoux un peu élevés, pour donner
plus d'espace de la Cavité du ventre et
facilité la reduction, j'observé de faire
rentrer d'abord ceux qui etoit sortit les
derniers, en dirigeant mon point d'appuy
sur la portion du mezentere afin de
~~Contenir~~ assujettir une plus grande quantité
a la fois, j'avoué cependant que si j'eût
esté seul j'aurait eû de la peine a reussir
attendu que mes quatre mains ne furent
point inutile pour les reduire entierement,
apres avoir satisfait a la premiere intention
la deuxieme intention qui consistoit a les
maintenir reduits, me paroit encore tres
dificile,

les sutures de la playe Ecartee l'une de
l'autre d'environ quatre poulces, laissoit
une portion d'intestin a decouvert que
faisoit toujours Effort pour sortir, la
dificulté de pratiquer les sutures, par
les accidents qui auroit put en resulter,
m'empecherent, d'employer ce moyen
l'entremise me parut impraticable, par
le peu de solidité des teguments que je
trouvois tres aminces dans toute l'Etendue
de la tumeur, Et qui n'auroit pas put resister
a l'Effort des fils, l'Eguille me une
parut pas plus avantageuse par la
pression que la longueur des fils passes
dans la cavité du ventre auroit put faire
sur les intestins Et par leur frottements
causer le spasme, l'inflamation Et la
gangreine, Le moyen qui me parut le
plus avantageux fut une compression
mollette, je me servit de compresse gradué
tres Epaisse, que je trempé dans l'Eau tiede
aminé d'un quatrieme d'Eau vulneraire
maintenut par le Bandage de corps le
scapulaire Et deux sous cuisse Exactement
serré
je recommandé a la malade de se tenir la teste
Basse, je fit faire une decoction avec les
fleurs de camamille Et de melilot animé
aussy avec un quatrieme d'Eau vulneraire pour
arroser l'appareil d'heure en heure afin de
l'Entretenir dans un Etat d'humidité Et
d'empecher que la portion d'intestin a decouvert
ne s'Enflame par le frottement Et la desication
de la compresse appliquee dessus

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

Quoy que la malade ~~quant~~ fut dans un Estat
de foiblesse que la crainte du danger pouvoit
avoir causé, Elle fut saignée trois fois de
bras en dix huit heures, je luy fit faire
une potion composée avec deux onces d'huille
d'amande douce deux onces d'eau de fleur
d'orange et deux gros de sirop diacode
que je reiteres tout les quatre heures je
supprimes toute nourriture la nuit fut assé
calme, il y eut un legere vomissement
d'aliments mal digerés, le lendemain
matin il y eut deux selles abondantes, on
nous apperceumes qu'elle avoit operé
la potion fut supprimée, la diette estoit de
bouillon fait avec le veau et le poulet, quelque
cuillere de gellé de viande
l'appareil ne fut levé que le troisieme jour
en presence de feu monsieur Martin membre
de cette compagnie ~~et conseiller de la Comunauté~~
nous trouvames les levres de la playe exactement
rapprochées l'une de l'autre et la tumeur assé
mollette, la playe fut pansée avec un plumaceau
couvert de baume d'arceus, les compresse
trempé dans la liqueur cy devant dites, et le
bandage semblable, en attendant que monsieur
Martin eut fait preparer celuy que nous avions
imaginer mieux convenir a la malade
le bandage consistoit en une espece de callotte
de fer blanc qui renfermoit exactement la
tumeur, l'interieure de cette callotte estoit garny
d'un matelats fait de crin ~~[illegible]~~ neuf
et recouvert de chamois, qui faisoit une
compression mollette sur toute les pointe

de la tumeur qui assujettissoit mieux les parties
pour les contenir dans le ventre, cette Callotte
estoit maintenue par une large ceinture
et deux sous cuisses, l'avantage de cette Callotte
pour les pancements est qu'il y avoit une
ouverture qui permettoit de l'ouvrir, elle
se refermoit par une goupille

le [illegible] ~~Cette~~ playe qui a continuer a estre pansée
par le sieur grasse a eu un succez si
favorable, que la malade a esté a pied +
de Montmartre dans la rue st germain
l'auxerrois, ou elle demeuroit, l'ulcère
a esté parfaitement cicatrisé le troisième
mois, la tumeur diminuée de moitié de
ce qu'elle estoit avant l'accident et la
malade jouissante d'une bonne santé

+ le trente deuxième jour de son accident

Les reflexions qu'on peut tirer de cette
observation sont premierement l'inutilité
des sutures malgré l'écartement des lèvres
de la playe, un bandage methodiquement fait
peut suffire, et seroit peut estre plus avantageux
dans la gastroraphie que les sutures qui s'y
pratiquent

secondement quoy qu'il y ait longtemps que les
parties contenues dans les vieilles hernies
soit hors du ventre et que les autres
accoutumées + a estre plus à leur aise, s'opposent
a la rentrée de celles cy, comme la plus part
des praticiens l'ont imaginé, on voit cependant
quel se prettent et quel parvient a leur faire
reprendre le lieu qu'elles doivent occuper dans
l'estat naturel, si on employe une compression
graduée

Dille

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

No 87.